

Essais cliniques en cours

Prise en charge des cancers du pancréas

Partie 2

Pr Jean-Baptiste BACHET
Sorbonne Université


Liens d'intérêt

- Honoraires : Amgen, Abbvie, AstraZeneca, Bayer, Merck Serono, Pierre Fabre, Roche, Sanofi, Servier, Takeda
- Conseiller : Amgen, Acobiom, Bayer, BMS, GSK, Incyte, Merck Serono, MSD, Pierre Fabre, Servier, Takeda

NEOADJUVANT

Résécable d'emblée


PREOPANC3 et Alliance AO21806



Objectif principal : survie globale

n=378 pour PREOPANC3
n=352 pour ALLIANCE

PANACH02



Objectif principal


Phase 2 : DFS n=244

Phase 3 : OS n=412

INDUCTION

Borderline


PANDAS



130 patients avec cancer du pancréas borderline (relecture centralisée à l'inclusion)


Objectif principal : taux de résection R0

NEOPREDICT



LOCALEMENT AVANCE

GABRINOX ART



103 patients

Objectifs principaux : efficacité de la séquence GABRINOX
faisabilité de radiothérapie par IRM linac

LAPNET – Phase 1b

ADK localement avancé
ECOG 0-1

**FOLFIRINOX
+ NP137**

NP137 : Ac anti-netrin-1


103 patients

Objectif principal : tolérance de la combinaison

METASTATIQUE

FUNGEMAX


OMS 0-1
Métastatique
≤ 75 ans



Objectif principal : Survie sans progression à 6 mois
288 patients, ratio 1:1:1

GEMFOX


OMS 0-2
Métastatique
Non éligible au
FOLFIRINOX



400 patients

Objectif principal : Survie Globale

PANORAMIX – L1




114 patients

Objectif principal : taux de SSP à 6 mois

PANORAMIX – L2

- Stratification:**
- center
 - ECOG PS (0/1)
 - biliary stent (Y vs N)
 - bichemotherapy (Y vs N)
 - ATB last 3 mths (Y vs N)



92 patients

Objectif principal : taux de SG à 6 mois

Merci de votre attention